

إرشادات لأولياء الأمور حول تطهير الأولاد الذكور

لقد قمنا للتو بتطهير ابنك نحن في Parsennklinikken AS نقدم لكم الإرشادات التالية:

مسكنات الألم

التخدير الموضعي الذي استخدم في عملية التطهير فعال لمدة ساعتين قبل إجراء العملية قمنا بإعطاء الطفل تحميلة باراسيتامول بالتناسب مع وزنه

يمكنكم اعطاء الطفل تحميلة باراسيتامول أربع مرات خلال 24 ساعة عادة لا يحتاج الطفل لجرعات من باراسيتامول بعد مضي يومين ، وعند الضرورة يمكن إعطاؤه مرتين باليوم.

إذا استمر الألم عند الطفل بعد جرعات الباراسيتامول يجب على الأهل مراجعة المركز أو أقرب طبيب مناوب.

مرحلة التئام الجرح

عند عملية الطهور تم تثبيت حلقة بلاستيكية عند رأس القضيب من الطبيعي أن يتغير لون الجلد إلى الأسود حتى تسقط الحلقة تسقط الحلقة مع الخيط عادة في فترة تتراوح من 4 - 8 أيام ولا تسقط هذه الحلقة دفعة واحدة. ويلتئم الجرح بنفس طريقة التئام الحبل السري. في حالات نادرة لا تسقط الحلقة بعد عشرة أيام عندها يجب مراجعة المركز الصحي.

العناية بالجرح

من الضروري جدا تنظيف الجرح بالماء عن طريق الغسل وليس المسح ، وذلك يوميا عند تغيير الحفاضات.

بإمكانكم استخدام الصابون أو الشامبو عند الاستحمام ولكن من الضروري غسل الجرح بالماء جيدا (بدون المسح على الجرح) وإزالة بقايا الشامبو قبل دهن المعقم على الجرح

اسم المعقم: Pyricept krem يدهن 2-3 مرات يوميا أول 3-5 أيام ويمكن شراؤه بدون وصفة طبية. ولا يجب استخدام أي مرهم آخر أو البودرة لحين سقوط الحلقة تماما.

نشاطات

لا داعي لتغيير نظام طعام الطفل، ويفضل في أول يومين أن يبقى الطفل في البيت وألا يوضع في العربة لمدة طويلة، ويجب الحذر من اهتزاز الطفل بقوة.
بعد ثلاثة أيام بإمكان الطفل أن يمارس نشاطاته الاعتيادية.

التهاب الجرح ومشاكله

يجب الإنتباه لعدم حصول نزيف في الجرح فهذا أمر خطير لأن الطفل لا يملك كمية كبيرة من الدم .

في حال وجود نزيف أو رؤية بعض نقاط الدم المتخثرة على الحفاضة يجب مراجعة المركز أو أقرب طبيب مناوب بالسرعة القصوى.

إذا كان الطفل هزيلا أو كانت قابليته للطعام قليلة يجب مراجعة المركز أو أقرب طبيب مناوب بسرعة لأنها ربما تكون أعراض التهاب.

يجب مراجعة الطبيب عند الحالات التالية

- إذا لم يتبول الطفل بعد مرور عشر ساعات على العملية يرجى الاتصال برقم الطوارئ في الحال.
- إذا تساقط دم من الجرح أو في حال وجود دم متخثر على الحفاضة يرجى الاتصال برقم الطوارئ في الحال.
- عند نزول الحلقة على القضيب وظهور ورم على رأس القضيب يرجى الاتصال برقم الطوارئ في الحال.
- عند وجود علامات التهاب من انتفاخ أو احمرار على البطن أو الفخذين أو القضيب يرجى الاتصال برقم الطوارئ في الحال.
- إذا لم تسقط الحلقة بعد مرور عشرة أيام يرجى الاتصال بالمستوصف.
- إذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار يمكنكم الاتصال بالمركز خلال وقت الدوام.

في حال وجود أي شيء غريب بعد العملية أو في حال رغبة الأهل بإجراء كشف لاحق للطفل بإمكانكم أخذ موعد مسبق عند الجراح خلال وقت الدوام.

Parsennklinikken As

العنوان: Sørkedalsveien 10B, Oslo

الهاتف (نهاراً): 22203375

رقم الطوارئ: 96919180 (فقط أول يومين من الجراحة).

البريد الإلكتروني: parsennklinikken@gmail.com